

## LE DÉPISTAGE DU VIH, GRATUIT ET SANS ORDONNANCE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, le VIHTEST est accessible sans avance de frais et sans ordonnance, sur simple demande et sans rendez-vous, dans tout laboratoire d'analyses médicales.

Le dépistage du VIH est un test classique, réalisé par votre laboratoire à partir d'une simple prise de sang.

Votre carte Vitale ou un numéro de sécurité sociale (y compris pour les bénéficiaires de l'AME) vous sera demandé. **Le test est pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie. Vous n'avez rien à payer au laboratoire.**



Si vous n'avez pas de couverture maladie, si vous voulez faire le test en gardant l'anonymat ou si vous êtes mineur, précisez-le au laboratoire ou rendez-vous dans un CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) ou dans un Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF) si vous êtes mineur(e).

## OÙ FAIRE LE TEST DU VIH ?

• Trouvez le laboratoire SYNLAB le plus proche sur : [synlab.fr](https://www.synlab.fr)

• Trouvez un CeGIDD sur :

[www.sida-info-service.org](https://www.sida-info-service.org)

## SE PROTÉGER CONTRE LE VIH



Les **préservatifs** sont une protection efficace contre le VIH et toutes les infections sexuellement transmissibles (*hépatites A, B ou C, syphilis, herpès génital, chlamydia, gonorrhée, trichomonas*). Ils sont aussi un moyen de contraception et peuvent être remboursés sur ordonnance.



La **PrEP** est un médicament qui empêche le virus du VIH de se développer et de se fixer dès son entrée dans le corps lors d'un rapport sexuel sans préservatif. Il peut être prescrit aux personnes séronégatives lorsqu'elles risquent d'être exposées au virus. Demandez conseil à votre médecin.

\*PrEP : Prophylaxie Pré-exposition



### ENSEMBLE, STOPPONS L'ÉPIDÉMIE DU VIH

Le dépistage du VIH est la clé pour arrêter l'épidémie. En faisant un test du VIH, vous contribuez à l'effort collectif pour atteindre zéro nouvelle infection par le VIH d'ici 2030.

 **Sida Info Service**  
**0 800 840 800**

**POUR TOUTE QUESTION**

Tampon du laboratoire

# SYNLAB

[www.synlab.fr](https://www.synlab.fr)

© 2022 SYNLAB

Janv 2022

# SYNLAB



**TEST GRATUIT  
SANS ORDONNANCE  
DANS TOUS LES LABOS**

## DÉPISTAGE DU VIH



Faire le VIHTEST, c'est la clé pour stopper la transmission du virus.

Document non contractuel Crédit photo : SYNLAB



## LE DÉPISTAGE DU VIH, POURQUOI ET COMMENT ?

Le VIH ou **Virus de l'Immuno-déficience Humaine** est une infection qui se transmet par le sang et les relations sexuelles.

Sans traitement, le VIH détruit progressivement le système immunitaire et les personnes infectées développent des maladies graves sur le long terme.

**Le VIH est responsable du SIDA** (Syndrome de l'Immunodéficience Acquise) qui est le stade avancé de l'infection.

**La seule façon de savoir si l'on est infecté(e) par le VIH est de faire un test de dépistage.** Une simple prise de sang suffit.



## DANS QUELS CAS FAIRE LE VIHTEST ?

**Faites le test maintenant, si :**

- Vous commencez ou arrêtez une relation amoureuse avec des rapports sexuels
- Vous ne voulez plus utiliser de préservatif
- Vous revenez d'un voyage durant lequel vous avez eu des relations sexuelles occasionnelles
- Vous avez le projet de concevoir un enfant
- Vous pensez avoir été exposé au virus
- Vous avez une autre IST (infection sexuellement transmissible)
- Vous avez des symptômes grippaux en dehors des périodes d'épidémies de grippe

**Certaines situations nécessitent de refaire le test VIH régulièrement :**

- Au moins une fois par an si vous avez des partenaires occasionnel(les)
- Tous les trois mois si vous n'utilisez pas systématiquement de préservatif avec des partenaires occasionnel(les)
- Tous les trois mois si vous êtes un homme et avez des rapports sexuels avec d'autres hommes

## SI VOTRE TEST EST NÉGATIF

**UN TEST NÉGATIF SIGNIFIE QUE VOUS N'ÊTES PAS INFECTÉ(E) PAR LE VIH,**

Si votre dernier rapport sexuel sans protection date de plus de six semaines.

Dans le cas contraire, refaites le test dans un mois et demi pour vérifier le résultat.

Si votre dernier rapport, sans protection, date de moins de 48 heures, rendez-vous immédiatement aux urgences d'un hôpital, qui évaluera le risque de transmission du VIH et pourra éventuellement prescrire un traitement préventif post-exposition (TPE).

Si vous avez des partenaires sexuel(es) occasionnel(les), faites le VIHTEST régulièrement. Programmer une alerte sur votre smartphone vous aidera à y penser.



## SI VOTRE TEST EST POSITIF

**UN TEST POSITIF SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES INFECTÉ PAR LE VIH.**

En cas d'infection confirmée au VIH, **il est très important d'avoir rapidement un traitement contre le VIH** et un suivi médical adapté à votre situation.

Le but du traitement est de réduire au maximum la multiplication du virus dans l'organisme. Généralement bien tolérés, **les médicaments antirétroviraux, annulent la charge virale** à condition de **respecter parfaitement le traitement indiqué par le médecin.**

Une personne avec une charge virale indétectable ne transmet plus le virus lors des relations sexuelles.



Le traitement du VIH est décidé par une équipe médicale spécialisée à l'hôpital et votre médecin traitant. Plus tôt vous êtes pris(e) en charge, plus vous avez de chances de vivre bien et longtemps, malgré l'infection.

**On ne guérit pas du VIH,**

mais, grâce aux traitements récents, les personnes vivent avec le virus et restent en bonne santé, peuvent avoir des relations sexuelles sans risque de transmettre le virus et faire des enfants sans qu'ils soient infectés.